

# PLAN HIGIENY DLA ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI

CO ?	KIEDY?	JAK?	CZYM?	KTO?
<b>MYCIE RĄK</b>	<p>Przed rozpoczęciem pracy. Przed opuszczeniem pracy. Po wyjściu z toalety. Przy widocznym zabrudzeniu. Przed podawaniem posiłków. Po kontakcie z wydzielinami i wydaliniami. Przed dezynfekcją higieniczną, jeśli ręce nie są czyste. W razie potrzeby.</p>	<p>Na zwilżone dłonie nanieść z dozownika płyn myjący, rozprowadzić, następnie dokładnie spłukać i osuszyć dłonie jednorazowym ręcznikiem.</p>	<p><b>Sterisol Liquid Soap</b> <b>Sterisol Soap Ultra Mild</b> <b>Dozownik łokciowy Sterisol</b> <b>Dozownik automatyczny Sterisol na fotokomórkę</b></p> <p><b>Farena (zalecane dozowanie za pomocą pompki)</b> <b>Wieszak naścienny</b> <b>Dozownik typu Lydos</b> <b>Dozownik typu Ingoman</b></p>	<p>Personel placówki (pracujący z dziećmi, przygotowujący posiłki oraz dzieci).</p>
<b>DEZYNFEKCJA RĄK</b>	<p>Przed rozpoczęciem pracy. Po zakończeniu pracy. Przed podawaniem posiłków. Po kontakcie z wydzielinami i wydaliniami. W razie potrzeby.</p> <p>W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień zaleca się częstsze stosowanie. Należy również rozważyć dezynfekcję rąk u dzieci (po konsultacji z lekarzem i pod kontrolą dorosłych).</p> <p><b>UWAGA!</b> Ręce przed dezynfekcją muszą być czyste i suche.</p>	<p>Na suchą skórę rąk nanieść preparat dezynfekcyjny. Dokładnie wcierać w skórę rąk, aż do wyschnięcia przez 30 s.</p>	<p><b>Sterisol Preop</b> <b>AHD 2000 Sterisol</b> <b>Dozownik łokciowy Sterisol</b> <b>Dozownik automatyczny Sterisol na fotokomórkę</b></p> <p><b>Aniosgel 85 NPC</b> <b>Wieszak naścienny</b> <b>Dozownik typu Ingoman</b></p> <p>Produkty wykazują działanie: bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójcze (w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).</p>	<p>Personel placówki (pracujący z dziećmi, przygotowujący posiłki).</p>
<b>POWIERZCHNIE MAŁE I TRUDNO DOSTĘPNE:</b>  <b>Odporne na działanie alkoholi, np.:</b> stoliki, krzesła i wszelkie inne przedmioty ulegające zanieczyszczeniu.	<p>W razie potrzeby. Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci.</p> <p>W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień zaleca się częstsze stosowanie.</p>	<p>Preparat równomiernie zaaplikować na całą dezynfekowaną powierzchnię lub równomiernie rozprowadzić za pomocą ściereczki. Nie wycierać. Pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji.</p> <p>Przetrzeć powierzchnie chusteczką i pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji.</p> <p><b>UWAGA!</b> Preparaty stosować na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie.</p>	<p><b>Fugaten Spray</b> Gotowy do użycia. min. 1 minuta</p> <p>Wykazuje działanie: bakterio-, drożdżo-, prątko- i wirusobójcze (w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).</p> <p><b>Lub</b></p> <p><b>Aniospray Quick</b> Gotowy do użycia. min. 30 sekund</p> <p>Wykazuje działanie: bakterio-, grzybo-, prątko-, wirusobójcze (w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).</p> <p><b>Lub</b></p> <p><b>Mediwipes Plus</b> Chusteczki gotowe do użycia. min. 30 sekund</p> <p>Wykazuje działanie: bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójcze (w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).</p> <p><b>UWAGA!</b> Preparaty alkoholowe - chronić przed dziećmi!</p>	<p>Personel placówki</p>
<b>Wrażliwe na działanie alkoholi, np.:</b> przewijaki, tapicerki, materace do ćwiczeń, foteliki, łożeczka, termometry i inne małe powierzchnie ulegające zanieczyszczeniu.	<p>Po każdym zanieczyszczeniu powierzchni. W razie potrzeby. Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci.</p> <p>W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień zaleca się częstsze stosowanie.</p>	<p>Nanieść preparat bezpośrednio na dezynfekowaną powierzchnię z odległości 30 cm lub na suchą, czystą ściereczkę. Dokładnie rozprowadzić za pomocą ściereczki po całej powierzchni. Nie wycierać do sucha, nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji.</p> <p>Przetrzeć powierzchnie chusteczką i pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji.</p>	<p><b>Lysoformin Plus-Schaum</b> Pianka gotowa do użycia. min. 5 minut</p> <p>Wykazuje działanie: bakterio-, drożdżo-, prątko- i wirusobójcze (w tym wirus wywołujący biegunki: Rota).</p> <p><b>Lub</b></p> <p><b>Mediwipes DM</b> Chusteczki gotowe do użycia. min. 5 minut</p> <p>Wykazują działanie: bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójcze (w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).</p>	<p>Personel placówki</p>
<b>ZABAWKI</b>	<p>W razie potrzeby. Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci.</p> <p>W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień zaleca się częstsze stosowanie.</p>	<p>Zabawki spryskać i pozostawić do wyschnięcia zgodnie z zalecanym czasem ekspozycji, po czym dokładnie zmyć wodą zdatną do picia.</p> <p>Nie stosować do zabawek pluszowych i tekstylnych.</p>	<p><b>Fugaten Spray</b> Gotowy do użycia. min. 1 minuta</p> <p>Wykazuje działanie: bakterio-, drożdżo-, prątko- i wirusobójcze (w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).</p> <p><b>Lub</b></p> <p><b>Aniospray Quick</b> Gotowy do użycia. min. 30 sekund</p> <p>Wykazuje działanie: bakterio-, grzybo-, prątko-, wirusobójcze (w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).</p> <p><b>Lub</b></p> <p><b>Lysoformin Plus-Schaum</b> Pianka gotowa do użycia. min. 5 minut</p> <p>Wykazuje działanie: bakterio-, drożdżo-, prątko- i wirusobójcze (w tym wirus wywołujący biegunki: Rota).</p>	<p>Personel placówki</p>
<b>POMIESZCZENIA</b> <b>Sale gimnastyczne, pokoje zabaw, szatnie, a w nich:</b> podłogi, białe drzwi, glazury, parapety i inne duże zmywalne powierzchnie.	<p>Po każdym zanieczyszczeniu powierzchni. W razie potrzeby. Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci.</p>	<p>Za pomocą mopów i ściereczek myć i dezynfekować, przecierając dokładnie całą powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia.</p> <p>Nie stosować na wykładziny materiałowe.</p>	<p><b>Surfanios Lemon Fresh MD</b> Preparat w koncentracji. 0,25% - 15 minut 2,5 ml na 1 litr wody 10 ml na 4 litry wody 20 ml na 8 litrów wody</p> <p>Wykazuje działanie: bakterio- (w tym: Legionella, Salmonella), grzybo-, prątko- i wirusobójcze (w tym wirusy wywołujące grype).</p>	<p>Personel placówki</p>
<b>Łazienki, a w nich:</b> umywalki, wanny, brodziki prysznicowe, muszle klozetowe.	<p>Po każdym zanieczyszczeniu powierzchni. W razie potrzeby. Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci.</p>	<p>Umyć i zdezynfekować preparatem myjąco-dezynfekującym przecierając dokładnie całą powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia.</p>	<p><b>Trichlorol</b> Preparat w proszku. 0,75% - 15 minut (3 miarki/4 litry wody)</p> <p>Wykazuje działanie: bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójcze (w tym wirus wywołujący biegunki: Rota).</p>	<p>Personel placówki</p>
<b>SANITARIATY</b> Szybka dezynfekcja suchych powierzchni klozetów, desek klozetowych, nocników, spłuczek i umywalk.	<p>W razie potrzeby. Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci.</p> <p>W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień zaleca się częstsze stosowanie.</p>	<p>Preparat równomiernie zaaplikować na całą dezynfekowaną powierzchnię lub równomiernie rozprowadzić za pomocą ściereczki.</p> <p>Nie wycierać. Pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji.</p>	<p><b>Fugaten Spray</b> Gotowy do użycia min. 1 minuta</p> <p>Wykazuje działanie: bakterio-, drożdżo-, prątko- i wirusobójcze (w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).</p> <p><b>Lub</b></p> <p><b>Aniospray Quick</b> Gotowy do użycia. min. 30 sekund</p> <p>Wykazuje działanie: bakterio-, grzybo-, prątko-, wirusobójcze (w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).</p> <p><b>UWAGA!</b> Preparaty alkoholowe - chronić przed dziećmi!</p>	<p>Personel placówki</p>

\* Przedstawiony Plan Higieny jest jedynie propozycją. Przyjęcie i stosowanie w/w procedur nie zwalnia użytkownika z obowiązku aktualizowania i kontrolowania jego ważności. Szczegółowe informacje dotyczące działania biobójczego poszczególnych preparatów w podanych czasach, dostępne są w ulotkach informacyjnych oraz na etykietach opakowań handlowych produktów.